

## 審査情報提供事例について

審査支払機関における診療（調剤）報酬に関する審査は、国民健康保険法及び各法、療担規則及び薬担規則並びに療担基準、診療（調剤）報酬点数表並びに関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて行われています。

他方、高度多様化する診療内容についての的確、かつ、迅速な審査を求められており、各審査委員会から自らの審査の参考とするため、他の審査委員会の審査状況について知りたいとの要望のある事例について、平成17年度より全国調査を実施し、各審査委員会及び国保連合会間で情報の共有をしてみいました。

今般、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査上の一般的な取扱いについて、「審査情報提供事例」として広く関係者に情報提供することといたしました。

今後、全国国保診療報酬審査委員会会長連絡協議会等で協議を重ね提供事例を逐次拡充させることとしております。

なお、療担規則等に照らして、それぞれの診療行為の必要性、妥当性などに係る医学的判断に基づいた審査が行われることを前提としていますので、本提供事例に示されている方向性がすべての個別事例に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるものでないことにご留意願います。

平成23年3月

369 フロセミド②（小児神経9）

《令和4年9月26日新規》

- 標榜薬効（薬効コード）  
利尿剤（213）
- 成分名  
フロセミド【内服薬】
- 主な製品名  
ラシックス錠10mg、ラシックス錠20mg、ラシックス錠40mg、ほか後  
発品あり
- 承認されている効能・効果  
高血圧症（本態性、腎性等）、悪性高血圧、心性浮腫（うっ血性心不  
全）、腎性浮腫、肝性浮腫、月経前緊張症、末梢血管障害による浮腫、  
尿路結石排出促進
- 承認されている用法・用量  
通常、成人にはフロセミドとして1日1回40～80mgを連日又は隔日経  
口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。腎機能不全等の場  
合にはさらに大量に用いることもある。ただし、悪性高血圧に用いる  
場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。
- 薬理作用
  - ① 利尿作用
  - ② 降圧作用
- 使用例  
原則として、「フロセミド【内服薬】」を「高カリウム性周期性四肢  
麻痺」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。
- 使用例において審査上認める根拠  
薬理作用が同様であり、妥当と推定される。
- 留意事項
  - (1) 当該使用例の用法・用量  
通常、成人にはフロセミドとして1日1回40～80mg、小児には1日体  
重当たり1～4mgを連日又は隔日経口投与する。なお、年齢、症状に

より適宜増減する。

- (2) 難治例や既存治療で効果不十分な場合に限り認める。
- (3) 腎機能障害、電解質異常の患者には慎重に投与すること。